

L'Antenne santé vous informe:

Les infections sexuellement transmissibles (IST)

= Toutes les infections transmises lors de relations sexuelles

CAUSES ›	Virus: VIH (Sida), Hépatite B, Herpès, Papilloma virus, Condylomes acuminés Bactéries: Gonorrhée, Chlamydia, Syphilis Parasites: Trichomonase, Gale Champignons: Mycoses
MALADIE ›	Parfois aucun signe. Signes les plus fréquents: Pertes urétrales ou vaginales, brûlures et douleurs en urinant, démangeaisons et lésions des organes génitaux, douleurs du bas ventre.
ÉVOLUTION ›	Certaines infections peuvent évoluer en cancer, provoquer une stérilité, augmenter le risque de transmission du VIH.
TRANSMISSION ›	Lors de rapports sexuels non protégés = prise de risque.
RECOMMANDATIONS ›	Consulter un médecin lors de prise de risque ou lors d'apparition d'un signe de maladie. Le traitement doit être rapide
DIAGNOSTIC ›	Examen des organes génitaux, examens de sang.
PRÉVENTION ›	Pratiquer le « safer sex ».
TRAITEMENT ›	Par comprimés, le plus souvent. LE OU LA PARTENAIRE DOIT SE FAIRE TRAITER EN MÊME TEMPS (pour éviter de se réinfecter mutuellement). Utiliser le préservatif jusqu'à la fin du traitement. Les partenaires occasionnels doivent aussi être informés et traités.

Pour information ou consultation

Antenne santé

4, rue de Candolle | Lu-ve: 10h-13h | T. 022 379 77 09



UNIVERSITÉ DE GENÈVE