

Capsule 7: Introduction aux prestations pharmaceutiques Cas pratique 11: triage antacides

12H700-Bachelor 2^e année

Dr Damien Cateau, pharmacien

Dre Noura Bawab, pharmacienne

PD Dr J.Berger, MERc, FPH, Chargé d'enseignement

Pharmacie d'Unisanté (Lausanne)

Cas pratique 11: situation

- Un.e patient.e d'une vingtaine d'année, connu.e de la pharmacie, demande des comprimés d'Alucol. Il / Elle se plaint de brûlures d'estomac.
- Vous le / la voyez depuis quelques temps à la pharmacie car il / elle est suivi.e pour un problème d'acné.
- Historique : traitement commencé il y a 2 mois
 - Tetralysal® 300mg: 1 capsule le matin pendant 3 mois
 - Remises :
 - 28 cpr le 7 avril
 - 28 cpr le 3 mai
 - Epiduo crème® = crème pour ttmt local de l'acné: remis le 7 avril

Cas pratique 11: informations pour le.la patient.e

- Tu as des brûlures au niveau de l'estomac (pas au niveau de l'œsophage supérieur), d'intensité modérée ;
- Tu a un sentiment de pesanteur sur l'estomac après avoir mangé
- Ces douleurs ont commencé il y a environ 15 jours, apparaissent 10-30 minutes après certains repas seulement, et disparaissent 2 à 3 heures après (repas de midi et soir, surtout) / pas de douleur la nuit
- Tu as eu quelques fois ce type de douleurs quand tu étais plus jeune, mais pas aussi fréquemment
- Tu n'a pas observé d'autres symptômes (transit normal, pas de sang, pas de fièvre)
- Tu n'a pas d'autres problèmes de santé et ne prend pas d'autres médicaments, à part celui contre l'acné
- Tu n'a pas observé de facteurs améliorants et n'a rien entrepris
- Tu est stressé car tu es en période d'examen. Pour cette raison, tu bois bcp plus de café et mange «n'importe comment »: sandwichs, pizzas, beaucoup de grignotage
- Tu es satisfait.e du traitement de Tetralysal® et d'Epiduo® : ton acné est en bonne voie d'amélioration
- Tu prends Tetralysal® comme recommandé: avec un grand verre d'eau. Tu n'a pas eu de problème digestif durant les 6 premières semaines de traitement avec Tetralysal

unisanté

Centre universitaire
de médecine générale
et santé publique · Lausanne

Corrigé du cas



Cas pratique 11: Résolution

- Drapeaux rouges?
→ Pas dans cette situations
- Remise du traitement demandé?
→ quels conseils donner?
- Compatibilité avec le traitement contre l'acné?

Dyspepsies: drapeaux rouges



Consultation médicale si:

- Douleurs en dehors des repas, qui réveille le patient durant la nuit (ulcère)
- Anémie, perte de poids, anorexie.
- Perte de sang (vomissures, ev. aussi dans les selles, sang noir)
- Vomissement importants
- Fortes douleurs
- Difficulté à avaler
- Symptômes aggravés par l'exercice : pathologie cardiaque?

Interaction avec le traitement contre l'acné?

compendium.ch®

Interactions

L'absorption des tétracyclines est influencée par les antiacides contenant de l'aluminium, du calcium, du magnésium, ainsi que leurs hydroxydes, oxydes et sels, ou du charbon actif, ainsi que par la colestyramine, les produits contenant du fer, le sucralfate et les sels de bismuth. Si Tetralsal 300 mg doit être pris en concomitance avec une telle substance, un intervalle d'environ 3 heures doit être respecté entre la prise des produits.

L'administration concomitante de tétracycline et de rétinoïdes oraux ou de vitamine A (plus de 10 000 UI/jour) présente un risque d'hypertension intracrânienne.

Les médicaments augmentant le pH gastrique peuvent réduire l'absorption des tétracyclines.

Lexicomp® Drug Interactions

X	Avoid combination	C	Monitor therapy	A	No known interaction
D	Consider therapy modification	B	No action needed	<i>More about Risk Ratings</i>	

2 Results

Filter Results by Item

Print

D

Lymecycline (Tetracyclines)

Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide (INT) (Antacids)

D

Lymecycline (Tetracyclines)

Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide (INT) (Magnesium Salts)

DISCLAIMER: Readers are advised that decisions regarding drug therapy must be based on the independent judgment of the clinician, changing information about a drug (eg, as reflected in the literature and manufacturer's most current product information), and changing medical practices.

Prise en charge de cette interaction

- Insister sur des mesures non-médicamenteuses (moins de café, repas gras, rester en position verticale) pour limiter la prise d'Alucol. S'il doit être pris, **le prendre à 3 heures d'intervalle** du Tetraysal
- Si prise occasionnelle dans ces conditions = risque acceptable. Rappel Tetraysal = Antibiotique au long cours (en général 3 mois) pour traiter l'acné ≠ antibiotique pour une infection aigüe
- L'analyse bénéfice/risque serait différente si on avait un patient plus âgé, avec des facteurs de risque d'ulcère qui reçoit une tétracycline pour une autre indication que l'acné.