


Gestion des cas COVID-19 et des clusters dans les établissements scolaires et préscolaires



La décision de testing réactif ou de recommandation de dépistage prend en compte le nombre de cas dans la classe.

⁴ **Vaccinés:**
pleinement vacciné selon recommandations [OFSP](#)

⁵ **Guéris:**
test COVID-19 positif dans les 12 derniers mois ou sérologie positive de 90 jours (prélèvement après le 15.11.2021).

¹ **Définition de contact étroit:**

- Contact < 1.50 mètre sans protection pendant > 15 min.
- La notion de contact étroit pour les élèves n'a de sens dans le cadre scolaire qu'à partir de l'ES-II.

² **Testing réactif en classe**

Test salivaire (prélèvement sur crachat), sur demande du SMC, à J0 et J5 puis tous les 5-7 jours tant que des cas positifs sont détectés (stop si 0 cas positif).
 Test PCR salivaire individuel

³ **Définition des degrés**

- SAPE: structure d'accueil de la petite enfance.
- Primaire: école primaire = EP = 1P à 8P (~ 4-12 ans).
- Secondaire I: cycle d'orientation = CO = 9^e, 10^e, 11^e (~ 12-15 ans).
- Secondaire II: collège, école de commerce, ECG, CFP, ACCES (~ 15-19 ans).
- Tertiaire: UNIGE, HES, IHEID, Ecole Supérieure (CFPS, CFPC, IFAGE, ESIG, ESEDE, ESAMB, ECLAB...) (> 18 ans).

Q40 contact étroit: prise en charge usuelle avec levée de quarantaine si test à J7 négatif.